

gèrement vaseux ». Notre collègue s'empressa de faire part de sa découverte aux entomologistes bordelais qui en firent une ample récolte.

Je dois à l'amabilité de l'un d'eux, M. E. GIRAUD, les intéressants renseignements suivants : « Je prends cette Cicindèle entre Andernos et Taussat, après les dernières villas d'Andernos, endroit marécageux, mais qui me paraît se dessécher et où poussent abondamment les joncs courts; pas avant juillet et jusqu'en septembre où elle devient rare. Plus il fait chaud, plus on en trouve. J'ai remonté la côte à partir de cet endroit jusqu'à 2 kilom. au-dessus d'Andernos; je n'en ai pas rencontré. A. JEAN me dit en avoir pris une près d'Arès en se dirigeant vers Andernos. Nous avons parcouru le bassin depuis cet endroit jusqu'à la Leyre sans en trouver une seule. A la Teste et à Arcachon nous l'avons cherchée en vain ».

Je suis heureux de pouvoir, à l'appui de ces notes, présenter ici les beaux dessins qu'a bien voulu m'offrir notre collègue L. PLANET. Ils donnent, mieux que la meilleure des descriptions, une idée des principaux passages entre le *C. trisignata* typique et la variété décrite par SOUVERBIE.

Il est à remarquer que les exemplaires très blancs (fig. 4) sont fort rares. Jusqu'à présent, dans le grand nombre de collections que j'ai pu examiner, je n'avais vu, comme E. BARTHE (*Miscell. entom.*, XXII [1914], p. 1), que des formes intermédiaires (fig. 2 et 3) et jamais la var. *subsuturalis* proprement dite, que mon ami E. GIRAUD m'a si obligeamment envoyée.

Description de deux espèces nouvelles d'Histérides [COL.]

par H. DESBORDES.

Platysoma (subg. **Platylister** Lew.) **bruneicola**, n. sp. — *Subparallelum, depressum, nigrum, nitidum. Frons subplana, vix concava. Pronotum impunctatum, stria marginali integra. Elytra depressa, striis 1^a-2^a integris, 3^a in medio interrupta, 4^a apice tantum notata, 5^a nulla vel apice minutissima, suturali nulla. Propygidium punctatum, punctis antice luteribusque deficientibus. Pygidium undique punctatum, margine parum elevato. Mesosternum emarginatum, stria marginali in medio interrupta. Tibiae anticae quadri- vel quinquedentatae, intermediae tridentatae, posticae bidentatae.* — Long. 5 mm.

HAB. Bornéo : Brunei.

Types : 5 exemplaires provenant de la coll. VAN DE POLL < coll. DESBORDES.

Espèce assez facile à distinguer par sa forme parallèle, son pronotum à strie marginale entière, non angulée derrière les yeux, sa strie mésosternale interrompue en face du prosternum, sa strie suturale nulle. La 5^e strie des élytres est tantôt nulle, tantôt représentée par un point apical. Les points du propygidium et du pygidium sont sensiblement de même grosseur; mais tandis que ce dernier est entièrement ponctué, il existe une marge lisse assez appréciable en avant sur le propygidium et une autre, beaucoup plus réduite, en arrière; les côtés sont également imponctués, sans cependant que la ponctuation de ce segment présente l'apparence d'une traînée de points.

Hister fortedentatus, n. sp. — *Ovalis, sut convexus, niger, nitidus. Caput impunctatum, fronte plana, stria integra antice recta, mandibulis convexis. Pronotum impunctatum, stria interna integra, externa debiliore abbreviata. Elytra laevia, stria externa subhumerali curta, striis 1-3 integris, 4-5 ad apicem vix notatis, stria 4 rudimento basali aucta, suturali nulla vel brevissima, epipleuris tristriatis. Propygidium pygidiumque punctis grossis sed raris notata. Prosternum laevi striatum. Mesosterni stria integra. Tibiae anteriores tridentatae, dentibus robustis.* — Long. 4,5-5 mm.

Types : 3 exemplaires, provenant de Khurda près Mhow (Indes anglaises), communiqués par M. E. CORDIER (coll. E. CORDIER et H. DESBORDES).

Cet *Hister*, qui appartient au 5^e groupe de la classification de MARSEUL, ressemble beaucoup à *H. furcipes* MARS., au moins au point de vue de la striation élytrale, mais il est sensiblement plus petit et plus ovale. En outre, chez *furcipes*, les deux stries du pronotum, très rapprochées, sont aussi longues et presque aussi fortes l'une que l'autre, la ponctuation des pygidia est remarquablement forte, les dents des tibias antérieurs sont exceptionnellement fortes et presque en forme de crochets; au contraire chez *fortedentatus*, la strie externe du pronotum est plus courte et beaucoup plus faible que l'interne, dont elle est assez éloignée, la ponctuation des pygidia est simplement forte et d'ailleurs très rare, et les tibias antérieurs sont robustes, mais non en crochet.

L'un des trois exemplaires que j'ai eus sous les yeux a un rudiment très court de strie suturale; chez les deux autres, on ne distingue aucun vestige de cette strie.